



Agrimatco

Klasifikācija

Valsts	Dzīvnieki (<i>Animalia</i>)
Virstips	Spirālveidīgie (<i>Lophotrochozoa</i>)
Tips	Gliemji (<i>Mollusca</i>)
Klase	Gliemeži (<i>Gastropoda</i>)

Gliemeži

Dace Lesiņa
agronome – dārzkope
SIA Agrimatco Latvia

dace.lesina@agrimatco-eu.com

tel. 264 56 642



Agrimatco

Gliemežu kaitējums



gliemežu pētnieki - malakologi

BIOLOĢIJA

LAUKSAIMNIECĪBA

PILSĒTVIDE

PIEMĀJAS DĀRZI





Agrimatco

Gliemežu kaitējums



**raibais
mīkstgliemezis**

Deroceras reticulatum.

Var bojāt zemenes.



Spānijas kailgliemezis

*Arion vulgaris. Vietām
nozīmīgs kaitēklis.*



parastais

gludgliemezis *Cochlicopa lubrica*

Bieži sastopams. Nav kaitēklis.



**lodveida
stiklgliemezis**

Vitrina pellucida

Pārtiek no citiem
gliemežiem.



Agrimatco

Gliemežu kaitējums

vietām nozīmīgs kaitēklis

raibais mīkstgliemezis *Deroceras reticulatum*

Spānijas kailgliemezis *Arion vulgaris*

sarkanais kailgliemezis *Arion rufus*

raibais vīngliemezis *Arianta arbustorum*

nav nozīmīgs kaitēklis

rūsas kailgliemezis *Arion fuscus*

joslainais kailgliemezis *Arion circumscriptus*

sidrabpelēkais kailgliemezis *Arion silvaticus*

dzeltensvītras kailgliemezis *Arion fasciatus*

tumšais vīngliemezis *Cornu aspersum*

dārza vīngliemezis *Cepaea hortensis*

dūkstāja mīkstgliemezis *Deroceras laeve*

āmura mīkstgliemezis *Deroceras sturanyi*

lodveida stikgliemezis *Vitina pellucida*

parastais gludgliemezis *Cochlicopa lubrica*

kambara gludspolīte *Oxychilus cellarius*

ķiploku gludspolīte *Oxychilus alliarius*

sārtā gludspolīte *Aegopinella nitidula*

parastais dzintargliemezis *Succinea putris*



Agrimatco

Barība



Atpazīsti invazīvos kailgliemežus pēc attēliem
<https://www.daba.gov.lv/lv/media/15146/download?attachment>

GLIEMEŽA VEIDS	BARĪBAS TIPS	KO ĒD	LOMA DABĀ
 AUGĒDĀJS	augu barība	lapas, jaunie dzinumi, ziedi, dārzeņi, augļi	augu “pārstrādātājs”, bet arī var būt kaitēklis
 SAPROFĀGS	trūdoši augi, sēnes	kritalas, bojāti augļi un dārzeņi, sēnes	palīdz noārdīt organisko materiālu, bagātina augsni
 PLĒSĒJS	dzīvnieku barība	citi sīki gliemeži, olas, kukaiņi, tārpi	regulē citu bezmugurkaulnieku populācijas
 VISĒDĀJS	augu + dzīvnieku barība	augus, sēnes, mazas dzīvnieku atliekas	elastīgs ēdienkartē, pielāgojas pieejamai barībai
 MINERĀLVIELU MEKLĒTĀJS	cits	Ca no kaļķakmens, gliemežvākiem	piedalās minerālu apritē un čaulu veidošanas līdzsvarā

BIOLOĢIJA

LAUKSAIMNIECĪBA

PILSĒTVIDE

PIEMĀJAS DĀRZI



Agrimatco

DZĪVES CIKLS UN VIDE



Vairāk par kailgliemežu dzīvi un ierobežošanas iespējām
<https://www.daba.gov.lv/lv/media/15143/download?attachment>

Gliemeži	Atkarībā no sugas..	Spānijas kailgliemezis
Spēja vairoties	1-2 reizes gadā dzīvdzemdētāji, hermafrodīti - katrs īpatnis spēj dēt olas, kas izšķīlas 2-6 nedēļu laikā	dēj līdz 400 olām augusta otrā pusē – oktobra vidum, kas izšķīlas 3-5 nedēļu laikā
Dzimumgatavība	2-3 mēnešos	10-11 mēnešos
Ziemo	olas, jaunie, pieaugušie	jaunie
Augstākā aktivitāte	mitrā laikā +5°C .. +20°C	mitrā laikā + 2°C .. +20°C
Mūža ilgums	2 mēneši – 5 gadi (daudziem 1 gads)	1 gads

BIOĻĢIJA

LAUKSAIMNIECĪBA

PILSĒTVIDE

PIEMĀJAS DĀRZI

Sikdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sikdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sikdatnes.

Lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Noraidīt

Apstiprināt visas

[Pārvaldīt sikdatnes](#) →



Dabas aizsardzības pārvalde

Par mums ▾

Pakalpojumi ▾

Aktualitātes ▾

Dabas daudzveidība ▾

Kontakti ▾



Meklet



Language



Piekļūstamība

Dabas teritoriju pārvaldība

Sugu un biotopu apsaimniekošana

Dabas dati

CITES

Dabas eksperti

Kompensācijas

Dabas izglītība

Dabas tūrisms

Faktu lapas - Invazīvās SAUSZEMES GLIEMEŽU sugas ↗

Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) pēdējos gados saņem regulārus ziņojumus un sūdzības no dažādiem Latvijas reģioniem par dabiskos biotopus, kultūraugus un mājdzīvnieku veselību apdraudošo Spānijas kailgliemezi Arion vulgaris. Gliemeži bieži tiek konstatēti lielā skaitā un nodara ievērojamus postījumus, jo īpaši dārzu īpašniekiem.

Zinātnieki aprēķinājuši, ka suga masveidā dārzos un citās vietās var nest zaudējumus un iznīcināt pat pusi ražas, noēdot kartupeļus, bietes, kāpostus, burkānus, gurķus, salātus, graudaugus, dekoratīvos augus, ziedaugus u.c. augus.

Suga Latvijas teritorijā ir sastopama kopš 2009. gada. Līdz 2025. gada 15. jūlijam iedzīvotāji par sugas sastopamību ziņojuši 1 223 reizes, visvairāk ziņojumi saņemti par Latvijas centrālo daļu.

Spānijas kailgliemezis ir ierindots Eiropas 100 visinvazīvāko dzīvnieku sarakstā. Lai gan no zinātniskā viedokļa arī Latvijā suga klasificējama kā invazīva, šobrīd Spānijas kailgliemezis nav oficiāli iekļauts invazīvo sugu sarakstā. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas izstrādē ir normatīvais regulējums, izvērtējot šīs sugas iekļaušanu vietējo invazīvo sugu sarakstā un mehānismu ieviešanai, lai būtu iespējams vērsties pret tiem īpašumu apsaimniekotājiem, kas neveic invazīvās sugas ierobežojošus pasākumus.

Latvijā kaitēklis galvenokārt tiek izplatīts ar stādiem, pie kuru saknēm atrodas gliemeža izdētās olas vai paši gliemji. Līdz ar stāda iestādīšanu gliemezis veiksmīgi iedzīvojas dārzos un caur neapsaimniekotām teritorijām, ceļmalām, grāvmalām un ūdenstilpju piekrastēm izplatās gan kaimiņu dārzos, gan arī dabiskās teritorijās. **Katrs gliemezis gada laikā spēj izdēt līdz pat 500 olām, kuras pārzlemo.** Tāpēc ir svarīgi saprast, ka Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanā ir jāiesaistās visu invadēto teritoriju īpašniekiem tūdaļ. Tā kā Spānijas kailgliemezis visintensīvāk olas dēj no jūnija līdz septembrim, ir jāpanāk, lai pēc iespējas mazāks gliemežu skaits sasniegtu olu dēšanas vecumu un izdētu olas.

INFORMĀCIJA UZ
25.06.2026.

Profilakse

LAUKSAIMNIECĪBA	PILSĒTVIDE	PIEMĀJAS DĀRZI
- gliemežiem tīkamas kultūras nesēt/nestādīt mitrās vietās, mežu tuvumā – tur tie barosies arī pa dienu nezāļu ierobežošana gan kur atrodas kultūraugs, gan malās augsnas nosusināšana		
aršana, irdināšana vismaz 10-15cm dziļumā - augsnas apstrāde ļoti vēlu rudenī - laukos kur gliemeži, nestādīt vēlos kartupeļus aizsargjoslas, kuras uzirdina, neļaujot veidoties apaugumam augu atlieku iestrāde augsnē	- nestādīt gliemežiem tīkamus augus vietās kuras nav iespējams regulāri applaut - augu atlieku aizvākšana, regulāri pļaujam un savācam zāli - dodam priekšroku kaisakņiem aizsargjoslu veidošana ar granti, smiltīm - regulāra perimetra aizsardzība no “iebrukuma” vietām - stādi mazāk interesējošus augus: čīkstenes, akmeņlauzītes, helēnijas, brūnactiņas, ģipsenes, ozolītes, graudzāles.	- nolasam ar rokām - ierīkojam slazdus uzrokam dārzus pirms sala pīles mulčējam ar skaidām, skujām, kas bojātu viņu ķermeni uzraugām slēpņus, paši veidojam: komposta kaudzes, dēļus, akmeņus



Agrimatco

Mehāniskas palīgierīces


- **Vara lente pret gliemežiem 5 m SOGO**

Pašlīmējoša. Varš rada nelielu elektrisku lādiņu, kas attur no šīs barjeras pārvarēšanas.



- **Kailgliemežu slazdi**

175x115x72mm. Viegli tīrāms. Atkārtoti izmantojams.





Agrimatco


Nematodes



Cenas ar PVN uz 2026.gada JŪNIJU

Nav nepieciešama AAL apliecība iegādei.

Risinājumi	Lietošana	Raksturojums
NEMATODES <i>Phasmarhabditis californica</i> , <i>P. hermaphrodita</i>	Salaista, izmantojot rupju sietiņu. Deva 0.05-0.3M/m ² , apstrādā līdz 3 x sezonā. Intervāls starp apstrādēm 2-6 nedēļas - atkarīgs no invāzijas lieluma.	• Nematodes iekļūst gliemeža ķermenī pa tā dabīgajām atverēm. Kad gliemeži iet bojā, nematodes meklē jaunu mājvietu kur baroties un vairoties. • Nematodes iespējams iegādāties tikai iepriekš pasūtot. Īss derīguma termiņš. • Iepakojums jāuzglabā ledusskapī un viss jāizlieto lietošanas reizē. • Nematodēm, tāpat kā gliemežiem svarīgi lai augsne būtu mitra. • Var lietot profilaksei ar samazinātu devu. • Izmaksas ~70EUR/30M = 100m² (ja daudz gliemežu)



BIOLOĢIJA

LAUKSAIMNIECĪBA

PILSĒTVIDE

PIEMĀJAS DĀRZI



REĢISTRĀCIJA

Agrimatco

49. NemaFence Phasma

Reģ. Nr. 0894, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Phasmarhabditis californica*).

SIA BASF

Dārzeni, garšaugi, dekoratīvie koki, dekoratīvie krūmi (kokaudzētavās), zemenes (atklātā laukā, tuneļos), <u>zāliens</u>	Gliemeži (<i>Gastropoda</i>)	Profilaktiski: 50 000	Apstrādājiet augsni, kad gliemeži ir aktīvi. Ja nepieciešams atkārtot 3 reizes, ik pēc 2-4 nedēļām	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gēlā vai pulverveida masā. Uzglabāšanas temperatūra no +1 °C līdz +5 °C
		Zemas invāzijas gadījumā: 150 000	Apstrādājiet augsni, kad gliemeži ir aktīvi. Ja nepieciešams atkārtot 3 reizes, ik pēc 2-6 nedēļām	
		Augstas invāzijas gadījumā: 300 000	Apstrādājiet augsni, kad gliemeži ir aktīvi. Ja nepieciešams atkārtot 3 reizes	

50. Nemaslug

Reģ. Nr. 0687, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Phasmarhabditis hermaphrodita*).

SIA BASF

Dārzeni, <u>krāšņumaugi</u>	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	300 000	Apstrādājiet augsni, kad gliemeži ir aktīvi. Ja nepieciešams, atkārtot ik pēc 6 nedēļām	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gēlā. Uzglabāšanas temperatūra no +1 °C līdz +5 °C
--------------------------------	---	---------	--	--



Agrimatco

SNAIL STOP

JAUNUMS!!!



Cenas ar PVN uz 2026.gada JŪNIJU.

Nav nepieciešama AAL aplikāba iegādei.

Risinājumi	Lietošana	Raksturojums
SNAIL STOP šķīdums no augu ziepēm	Uzsmidzinot gliemežiem, tie iet bojā dažu minūšu laikā. Lieto slazdos. Neaizstājams vertikālu virsmu apstrādei: pagrabā, siltumnīcā.	• Vienlīdz labi iedarbojas uz visa izmēra gliemežiem un to olām. • Nav kaitīgs augiem, bet tieši uz ziediem nav ieteicams smidzināt. • Slazdi: ielej traukā Snail Stop un trauka vidū izveido saliņu ēsmai (bojāts ābols, Vitrol GB granulas vai kas cits). Gliemeži dodoties uz ēsmu izšķīst. Novietot tā lai lietus netiek slazdā. Šādam slazdam nav iedarbības termiņa. • Vidē bioloģiski noārdās. Satur augu valsts ziepes, etanolu, virsmaktīvās vielas, organisko šķīdinātāju. • 7.68EUR/0.5L ar smidzinātāju un 33.50EUR/5L




1 celiņu un
augu apstrāde



2 siltumnīcu un
pagrabu sienu
apstrāde



3 slazdu
izveidošanai





BIOLOĢIJA

LAUKSAIMNIECĪBA

PILSĒTVIDE

PIEMĀJAS DĀRZI





KALIMAK

JAUNUMS!!!

Agrimatco

Kalimak: Dabiska Aizsardzība Pret Gliemjiem un Gliemežiem

Kā Tas Darbojas? Unikāls Aizsardzības Mehānisms



1. Uzsūcas Augā

Produkts caur lapām iekļūst augā un izplatās visos tā audos.



2. Rada "Fizioloģisku Barjeru"

Tas maina auga sulas garšu, padarot to rūgtu un nepievilcīgu kaitēkļiem.



3. Atbaida, Ne Nogalina

Gliemji un gliemeži pārtrauc baroties un meklē citu barības avotu.



Galvenās Priekšrocības un Lietošana



Ilgstoša un Noturīga Iedarbība

Efektīvs arī pēc lietus vai laistīšanas, aizsargā arī jaunus dzinumus.



Drošs un Videi Draudzīgs

Nekaitīgs mājdzīvniekiem, apputeksnētājiem un derīgai faunai. Bez atliekvielām.



Piemērots Bioloģiskajai Saimniecībai

Apstiprināts lietošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā (Ecocert).

Svarīgākie Norādījumi Lietošanai

 Deva	40-50 ml / 10 L ūdens
 Apstrādes biežums	Ik pēc 10-15 dienām
 Smidzinājuma pH	Optimālais līmenis: 5.5 - 6.5



Agrimatco

KALIMAK


JAUNUMS!!!



Cenas ar PVN uz 2026.gada JŪNIJU.

Nav nepieciešama AAL aplicība iegādei.

Risinājumi	Lietošana	Raksturojums
KALIMAK šķīdums no augu ekstraktiem + Mn	Uzsmidzina uz augiem profilaktiski vai pamanot gliemežus. Nepieciešamības gadījumā atkārtot pēc 10-15 dienām. Deva 4-5L/ha jeb 4-5ml/L ūdens.	• Repelents - īpašais maisījums rada "vairoga efektu" atturot no vēlmes baroties! • Translamināra iedarbība • Apstrādātie augi kļūst gliemežiem "negaršīgi", bet gala produkta garša nemainās. • Nav ietekmes uz apputeksnētājiem, dzīvniekiem vai augiem. • Nav ierobežojumi tvertnes maisījumos, izņemot sārmaini produkti un minerāļļas. • Lietus nenoskalo. Neveidojas rezistence. • Ūdeni sagatavo pH 5.5-6.5 (Vito pH 5, Spray Plus) • VAV pievienošana uzlabo efektivitāti. Īpaši silikoni (Bona Gold). • Bioloģisks. Nav nogaidīšanas laika. 0 atliekvielas! • Fasējums 5.95EUR/250ml un 44.85EUR/5L.



BIOLOĢIJA

LAUKSAIMNIECĪBA

PILSĒTVIDE

PIEMĀJAS DĀRZI




Agrimatco

SLUXX[®] HP



*Cenas ar PVN uz 2026.gada jūniju.
Ir nepieciešama AAL apliecība iegādei.*

Risinājumi	Lietošana	Raksturojums
SLUXX dzelzs (III) fosfāts, 29.7 g/kg (Ironmax Pro 24.2 g/kg, Ferromol 9.9 g/kg)	Izkaisa granulas dekoratīvajos stādījumos/sējumos gliemežu invāzijas vietās. Deva 7 kg/ha.	• Gliemeži apēd granulas un neizdalot gļotas aizlien uz savām slēpšanās vietām un tur aiziet bojā. Nav ietekmes uz olām. • Granulas ir ļoti lietus noturīgas. • Sastāvs ir drošs cilvēkiem un dzīvniekiem. Nonākot vidē noārdās par augu barības vielām: dzelzi un fosforu. • Efektīvs arī agrā pavasarī un vēlā rudenī, kad metaldehīds mazāk efektīvs. • Bioloģisks. • Fasējums 62.92EUR/10kg



BIOLOĢIJA

LAUKSAIMNIECĪBA

PILSĒTVIDE

PIEMĀJAS DĀRZI



Agrimatco

REĢISTRĀCIJA

5. SLUX^{HP}

Reģ. Nr. 0396, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: dzelzs (III) fosfāts, 29.7 g/kg.

Limacīds.

W.Neudorff GmbH KG

Lauksaimniecības un <u>dekoratīvās</u> <u>kultūras</u> (atklātā laukā un segtās platībās)	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas sējumu vai stādījumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	-	4
---	--	---	---	---	---





Agrimatco

VITROL GB

JAUNUMS!!!



Cenas ar PVN uz 2026.gada JŪNIJU.

Nav nepieciešama AAL aplicība iegādei.

Risinājumi	Lietošana	Raksturojums
VITROL GB dzelzs pirofosfāts, 24 g/kg	Izkaisa graudaugiem, eļļas augiem, kartupeļiem, kāpostaugiem, zemenēm, ogulājiem, dekoratīvajiem augiem gliemežu invāzijas vietās. Deva 7kg/ha jeb 7g/10m ² .	- Gliemeži apēd granulas un neizdalot gļotas aizlien uz savām slēpšanās vietām un tur aiziet bojā. Nav ietekmes uz olām. - Garnulas ir mazāk lietus noturīgas kā Sluxx, bet to iedarbība ir ātrāka. - Sastāvs ir labai draudzīgs, nonākot vidē noārdās par augu barības vielām: dzelzi un fosforu. Tūlīt pēc apstrādes teritorijā var atrasties cilvēki un dzīvnieki. - Mitrā laikā granulas ir gliemežiem īpaši pievilcīgas, jo sastāvā ir pievilinoša viela. - Efektīvs arī agrā pavasarī un vēlā rudenī, kad metāldehīds mazāk efektīvs. - Reģistrēts AAL. Iegādei nav nepieciešama AAL lietotāja aplicība. - Bioloģisks. Vīszemākās apstrādes izmaksas!

BROS

VITROL GB

- efektīvs mīkstgliemežu, kailgliemežu un gliemežu ierobežošanai
- var lietot teritorijās, kur uzturās mājdzīvnieki, putni un eži
- izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
- ēsma ir gatava lietošanai granulu formā – viegli izkliedējama
- ātra iedarbība – gliemeži uzreiz pārstāj baroties ar augiem

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.



JAUNUMS!



6.40EUR/250g
15.70EUR/1kg
130EUR/20kg
~5250EUR/1T

BIOLOĢIJA

LAUKSAIMNIECĪBA

PILSĒTVIDE

PIEMĀJAS DĀRZI



REĢISTRĀCIJA

Agrimatc 6.1. Vitrol GB

Reģ. Nr. 0857, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: dzelzs pirofosfāts, 24 g/kg.

Limacīds.

Bros Sp. z o.o.

Profesionāliem lietotājiem:

Graudaugi, eļļas augi	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas sējumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	-	6
Kartupeļi	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i> , <i>Limax spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), vīngliemeži (<i>Cepaea spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas stādījumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	-	6
Galviņkāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, brokoļi, salāti, lapu dārzeņi (atklātā laukā, tuneļos, segtās platībās)	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), gliemeži (<i>Helix spp.</i>), vīngliemeži (<i>Cepaea spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas stādījumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	-	6
Zemenes, ogulāji (atklātā laukā, tuneļos, segtās platībās)	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), gliemeži (<i>Helix spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas stādījumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	-	6
<u>Dekoratīvās kultūras</u> (atklātā lauka, tuneļos un segtās platībās)	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), gliemeži (<i>Helix spp.</i>), vīngliemeži (<i>Cepaea spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas sējumu vai stādījumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	-	6



Agrimatco

Metaldehīdu saturošie



*Cenas ar PVN uz 2026.gada JŪNIJU.
Ir nepieciešama AAL apliecība iegādei.*

Risinājumi	Lietošana	Raksturojums
Meridian Lima Oro Metaldehīds, 50 g/kg (Gusto 30g/kg)	Izkaisa gliemežu invāzijas vietās labībai, rapsim, kukurūzai, ābelēm, bumbierēm, jānogām, upenēm, ērkšķogām, avenēm, kazenēm, salātiem, dekoratīvajās kultūrās, ganībās un zālājā ierīkošanas gadā. Deva 7 kg/ha. Ja nepieciešams, apstrādi atkārtoti pēc 7-10 dienām. Gadā atļauts veikt 2 apstrādes.	• Gliemeži iet bojā gan apēdot granulas, gan nonākot saskarē ar granulām. • Lieto mitrā laikā, kad gliemeži ir visaktīvākie. • Vēsā laikā zemāku efektivitāti, jo gliemeži ir mazāk aktīvi un to dehidratācijas process norit lēnāk. • Ātrāka iedarbība – gliemeži iet bojā 1-2 dienu laikā. • Ķīmiskas izcelsmes. Toksisks mājdzīvniekiem un savvaļas dzīvniekiem. • Mirušie atūdeņojušies gliemeži paliek redzami augsnes virspusē, rada smaku un piesaista kukaiņus. • 8.23EUR/1kg (Meridian); 151.25EUR/25kg (Lima Oro); 5868EUR/T



Izvairieties lietot vēlinajās attīstības stadijās uz ēdamām auga daļām.



Izvairieties lietot, ja gaidāms spēcīgs lietus, granulas pārāk ātri izšķīdīs un kļūs mazefektīvas.

BIOLOĢIJA

LAUKSAIMNIECĪBA

PILSĒTVIDE

PIEMĀJAS DĀRZI



Agrimatco

REĢISTRĀCIJA

4. Lima Oro

Reģ. Nr. 0568, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metaldehīds, 50 g/kg.
Limacīds.
Sharda Cropchem España S.L.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Limgol

Reģ. Nr. 0586, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metaldehīds, 50 g/kg.
Limacīds.
Sharda Cropchem España S.L.

Meridian

Reģ. Nr. 0569, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metaldehīds, 50 g/kg.
Limacīds.
Sharda Cropchem España S.L.

<u>Dekoratīvās kultūras, zāliens</u>	<i>Kailgliemeži (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.)</i>	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietas stādījumā vai sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, kultūrauga veģetācijas periodā (AS 00-99). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām	-	2
--	--	-----	---	---	---



Agrimatco



RISINĀJUMI	PRIEKŠROCĪBAS	LAUKSAIM- NIECĪBA	PILSĒTVIDE	PIEMĀJAS DĀRZI
Nematodes	bioloģiski, efektīvi			x
Snail Stop Jaunums!	organiskas izcelsmes, tūlītējs efekts, vertikālām virsmām, slazdiem		x	x
Kalimak Jaunums!	bioloģisks, lokāli sistēmisks, smidzināms repelents, laba cena	x	x	x
Sluxx HP	bioloģisks, lietus noturīgas granulas	x	x	
Vitrol GB Jaunums!	bioloģisks, ātra iedarbība, laba cena	x	x populārs	x populārs
Meridian	efektīvs un ātrs	x populārs	x	



Agrimatco

Kur var iegādāties?

Lielākajos dārzkopības veikalos



Rīgā, Tīraines iela 5c, 29106592

Iecavā, Rīgas iela 49, 26458969



Valmierā, Rīgas iela 76a, 25414342


www.agrimatco.lv

...jautājumi?

Zemesvēži *Gryllotalpa gryllotalpa* L.



- ❑ Jūnijā ♀ 20-30cm dziļumā ligzdā dēj olas, pēc 20 dienām izšķilas 30-300 mazuļi.
- ❑ Kūdrainu, irdenu ar kūtsmēsliem bagātu siltu augsni.
- ❑ Mūsu dārzos atceļo arī ar melnzemi, kūtsmēsliem, tehnikas pakalpojumu.
- ❑ Visēdājs – ēd augu saknes, augu atliekas un arī citus augsnes dzīvos iemītniekus.



https://www.facebook.com/reel/970889415780546?locale=lv_LV