

galda vīnogas



- Palielina sakņu un agrīno dzinumumu augšanas sparību
- Veicina garāku ķekaru veidošanos, tā rezultātā lielākas ogas, mazāk puves
- Palielina ogu viendabīgumu un izmēru
- Palielina ekstra klases ķekaru skaitu
- Uzlabo ogu iekrāsošanos
- Palielina cukura līmeni ogās ražas laikā
- Palielina atdevi



Kelpak ir dabisks biostimulators, kas iegūts no svaigi vāktām *Ecklonia maxima*, brūnaļģēm Dienvidāfrikas rietumu krastā. Kelpak ražošanā izmantota auksto šūnu ekstrakcijas metode, lai saglabātu īpašos savienojumus šūnu sulā. Kelpak būtiski uzlabo vispārējo auga augšanu, attīstību un palielina galda vīnogu ražu.


Kelpak

Līderis pasaulē jūras aļģu produktu ražošanā vairāk nekā četrdesmit gadus



Atdeve lietojot Kelpak galda vīnogās Dienvidāfrikā

(%) ienākumu pieaugums pret kontroli



Vīnogu kvalitātes pieaugums Dienvidāfrikā		
ŠĶIRNE	EKSPORTA IEPAKOJUMU PIEAUGUMS	EKSPORTA KRĀSOJUMA PIEAUGUMS
Thompson	+ 3%	-
Flame Seedless	+ 6%	+ 19%
Red Globe	+ 11%	+ 28%
Crimson Seedless	+ 6%	+ 5%
Superior Seedless	+ 5%	-
Prime Seedless	+ 10%	-
Dan-ben-Hannah	+ 11%	+ 11%
Dauphine	+ 7%	-
Sunred Seedless	+ 2%	+ 7%


Lapotnes apsmidzināšana dažreiz tiek aizstāta ar tiešām ķekaru apstrādēm.

Kelpak un forhlorfenurona (FCF) ietekme uz ķekara svaru (g)

Lielāki ķekari galvenokārt palielināta ogu izmēra dēļ.

Kelpak 3L/ha sākot ar ogu diam. 1mm un atkārt 2 x ik pēc 10 dienām

■ Kontrole ■ FCF ■ Kelpak + FCF



IETEICAMĀS LIETOŠANAS DEVAS

Lai stimulētu sakņu augšanu, agrinumu un garāku ķekaru veidošanos.

Apsmidzina lapotni ar 2 L/ha, kad dzinumi 5 - 10 cm. Var apstrādi atkārtot pēc 14 dienām.

Lai palielinātu ogu izmēru un kvalitāti.

Apsmidzina lapotni ar vismaz 3 L/ha sākot ar ogu 4-7 mm diametru. Atkārt 2-3 reizes ar 10-14 dienu intervālu.

Lai uzlabotu ogu krāsu un palielinātu cukura saturu.

Apsmidzina lapotni ar 3 L/ha ogām sākot iekrāsoties (V 100 stadija). Atkārt 2-3 reizes ar 10-14 dienu intervālu.

Ja izsmidzina ūdeni virs 1000 L/ha, tad Kelpak pievieno 1:300.

Izmantojot elektrostātiskos smidzinātājus (ūdens padeve 60 L/ha) Kelpak deva 4 - 5 L/ha. Lapotnes apstrādi var aizstāt ar ķekaru iemērķšanu 1% Kelpak šķīdumā vai smidzinājumu tieši uz ķekariem. Var apstrādei pievienot giberelīnskābi.

Kelpak® tiek ražots izmantojot unikālu auksto Cellburst® ekstrakcijas metodi

