

Vegenergy

**Koncentrēts augu izcelsmes L- α
brīvo aminoskābju biostimulators
augu stresa mazināšanai, lai
uzlabotu kultūraugu ražību**

Apraksts

Vegenergy ir augstas koncentrācijas L- α brīvo aminoskābju biostimulators, kas augiem mazina abiotisko stresu, ja to lieto stresa laikā vai pēc tā, izmantojot tā ārstniecisko iedarbību. Vegenergy aminoskābēm ir izteiktas antistresa un barojošās īpašības.

Vegenergy mazina abiotisko stresu, atkārtoti aktivizējot kultūraugu ogļhidrātu un slāpekļa metabolismu, īpaši ķīmiska vai osmotiska stresa situācijās, piemēram, sausuma apstākļos vai lietojot augu aizsardzības līdzekļus. Dažas no Vegenergy sastāvā esošajām L- α brīvajām aminoskābēm ir tiešie pretstresa savienojumi, savukārt citas L- α brīvās aminoskābes augs var nekavējoties izmantot, lai pats sintezētu pretstresa savienojumus, olbaltumvielas un citas svarīgas molekulas, lai nodrošinātu nepārtrauktu augšanu. Vegenergy arī uzlabo citu mēslošanas līdzekļu uzņemšanos, ja tie tiek lietoti vienlaicīgi, pateicoties spējai saistīties ar barības vielām.

Vegenergy ieteicams lietot ārpussakņu mēslošanai ielākajai daļai kultūraugu, un tas ir piemērots arī pilienvēda laistīšanai.

Priekšrocības

- Ārstniecisks abiotiskā stresa mazinātājs, īpaši, ja to lieto stresa laikā vai pēc tā.
- Daudzveidīgā aminogramma nodrošina vairāk nekā 17 aminoskābes, kas nepieciešamas augu augšanai un stresa mazināšanai.
- Samazina augu aizsardzības līdzekļu negatīvo ietekmi uz kultūraugu.
- Piemērots lietošanai visā veģetācijas laikā, 100% ūdenī šķīstošs.
- Vienlaicīga lietošana ar mēslošanas līdzekļiem uzlabo to uzņemšanos un barības vielu efektivitāti.

Tehniskā specifikācija

Brīvās L- α aminoskābes: 23 % (257,6 g/l)

Kopējais slāpeklis (N): 4,6 % (51,5 g/l)

Manufactured by: Tradecorp

Parque Empresarial Cristalia, C.
Vía de los Poblados, 3, Edificio 5,
28033 Madrid

lasma.lapina@rovensanext.com
elina.morzevska@rovensanext.com
www.rovensanext.lv



Let's grow greener

 **Rovensa
Next**

Vegenergy

Lietojums un devas

Ārpussakņu mēslošana		
Ziedošie dārzeņi	1–2 l/ha	2–3 reizes ar 10–14 dienu intervālu, sākot no pilnīgas lapu atvēršanās. Nepārtraukti ziedošiem augiem, piemēram, tomātiem un čili, lietot ik pēc 28 dienām.
Lapu dārzeņi	1–2 l/ha	2–4 reizes ar 10–14 dienu intervālu, sākot no pilnīgas lapu parādīšanās vai pārstādīšanās.
Graudaugi, pākšaugi un rapši	1–3 l/ha	2–3 reizes ar 14–21 dienu intervālu, cerošanas laikā, pirmā mezgla un karoglapas stadijā (BBCH 21, 31, 39) vai 4–8 lapu stadijā kukurūzai, 4 lapu, 2–4 sāndzinumu, rozetes un pumpuru veidošanās laikā (BBCH 14, 22–24, 31, 51) rapsim un 2–4 lapu un pumpuru veidošanās laikā pākšaugiem. Var lietot rudenī pēc sadīgšanas visiem ziemājiem.
Kartupeļi, sakņaugi un bumbuļi	2–4 l/ha	1–3 reizes, kad augs sasniedz 10 cm, līdz augu sakļaušanās vai 4 lapu stadijai sīpoliem un burkāniem. Izmantojiet lielu ūdens daudzumu (piemēram, 500 l/ha).
Augļu dārzi un vīnogulāji	2–5 l/ha	2–4 reizes ar 14–21 dienu intervālu veģetatīvās augšanas laikā, pirms un pēc ziedēšanas.
Ja nepieciešams samazināt abiotiskā stresa ietekmi visiem kultūraugiem	0,5–2 l/ha	2–8 reizes, lietojot kopā ar citiem augkopības produktiem.
Ja nepieciešama atkopšana pēc stresa gadījuma	2–4 l/ha	1–3 lietošanas reizes ar 7–10 dienu intervālu.

Smidzināt uz sausām lapām, izmantojot vismaz 150–200 l/ha, lai nodrošinātu optimālu lapu pārklājumu, un optimālai uzņemšanai jāparedz 3–4 stundas bez lietus. Dažiem kauleņaugļiem ir atšķirīga jutība pret aminoskābēm, tāpēc pirms lietošanas pilnā platībā ieteicams veikt pārbaudi. Nelietojiet ziedēšanas vai augļu veidošanās laikā sēkleņaugļos.

Mēslošana		
Vispārējā deva	2–4 l/ha	3–6 reizes ar 10–14 dienu intervālu, sākot no veģetācijas cikla sākuma

