

NeemAzal
Insekticīds/akaricīds.

Sistēmas un zarnu iedarbības insekticīds un akaricīds lapu alotāju, augu sūcēju un lapu graužēju ierobežošanai kartupeļu, galvīnkāpostu, Briseles kāpostu un Savoņas kāpostu stādījumos, gurķu, ķirbju, cukīni, kabaču, tomātu un baklažānu sējumos un stādījumos (atklātā laukā un segtās platībās), piparu stādījumos (segtās platībās), garšaugu, izņemot maurlokus, sējumos un stādījumos (atklātā laukā un segtās platībās), spinātu, skābeņu, portulaku un lapu biešu sējumos (atklātā laukā), ābeļu stādījumos, vīnogulāju (neražojošu) stādījumos, krāšņumaugu, dekoratīvo augu, izņemot skujkoku, sējumos un stādījumos (atklātā laukā un segtās platībās) un ozolu stādījumos, ķiršu, plūmju, aveņu, kazeņu, upeņu, jāņogu un ērkšķogu stādījumos.

Darbīgā viela: azadiraktīna A 10g/l

Preparāta forma: emulsijas koncentrāts

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 43

Reģistrācijas klase: 3

Iepakojums: (20x250ml, 20x100ml, 120x50ml, 240x5ml)

Partijas Nr., ražošanas datumu un pārfasēšanas datumu skatīt uz iepakojuma

EUH208 Satur azadiraktīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P102 Sargāt no bērniem.

P501 Atbrīvojoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošos normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecu tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Spe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu un ozolu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm un kartupeļu, dārzeņu, vīnogulāju, krāšņumaugu un dekoratīvo augu sējumos un stādījumos 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons – 112.

Ražotājs:

Trifolio – M GmbH

Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, D-35633 Lahnau

Tel.: +49 6441-20977-0, Fax.: +49 6441-20977-50

E-pasts: info@trifolio-m.de

Pārfasētājs:

UAB Inovacine firma "MKDS"

Piliakalnio 68,

Nemenčine, LT 15175

Vilniaus raj. Sav.

Tālrs.: +370 52 726727

www.mkds.lt

Paralēlās tirdzniecības atļaujas īpašnieks un izplatītājs:

SIA "Agrimatco Latvia"

Tīraines iela 5c, Rīga, LV-1058

Tel.: 67807711

E-pasts: agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com

Uzglabāšana.

Uzglabāt tumšā, vēsā, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās, izolēti no sildierīcēm un atklātas uguns. Uzglabāšanas temperatūra 0°C līdz +25°C. Glabājot temperatūrā zem +10°C, var izveidoties nogulsnes, kuras izzūd, ja iepakojumu ar preparātu uzsilda līdz +30°C, ieliekot silta ūdens vannā, un pēc uzsildīšanas saskalina, un kuras neietekmē preparāta lietošanas efektivitāti.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

NeemAzal
Insekticīds/akaricīds.

Sistēmas un zarnu iedarbības insekticīds un akaricīds lapu alotāju, augu sūcēju un lapu grauzēju ierobežošanai kartupeļu, galviņkāpostu, Briseles kāpostu un Savoņas kāpostu stādījumos, gurķu, ķirbju, cukīni, kabaču, tomātu un baklažānu sējumos un stādījumos (atklātā laukā un segtās platībās), piparu stādījumos (segtās platībās), garšaugu, izņemot maurlokus, sējumos un stādījumos (atklātā laukā un segtās platībās), spinātu, skābeņu, portulaku un lapu biešu sējumos (atklātā laukā), ābeļu stādījumos, vīnogulāju (neražojošu) stādījumos, krāšņumaugu, dekoratīvo augu, izņemot skujkoku, sējumos un stādījumos (atklātā laukā un segtās platībās) un ozolu stādījumos, ķiršu, plūmju, aveņu, kazeņu, upeņu, jāņogu un ērkšķogu stādījumos.

Darbīgā viela: azadiraktīna A 10g/l

Preparāta forma: emulsijas koncentrāts

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 43

Reģistrācijas klase: 3

Iepakojums: 250ml, 100ml, 50ml, 5ml

Partijas Nr., ražošanas datumu un pārvasēšanas datumu skatīt uz iepakojuma

EUH208 Satur azadiraktīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P102 Sargāt no bērniem.

P501 Atbrīvojoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošos normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Spe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu un ozolu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm un kartupeļu, dārzenju, vīnogulāju, krāšņumaugu un dekoratīvo augu sējumos un stādījumos 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons – 112.

Ražotājs:

Trifolio – M GmbH

Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, D-35633 Lahnau

Tel.: +49 6441-20977-0, Fax.: +49 6441-20977-50

E-pasts: info@trifolio-m.de

Pārvasētājs:

UAB Inovacine firma "MKDS"

Piliakalnio 68,

Nemenčine, LT 15175

Vilniaus raj. Sav.

Tālr.: +370 52 726727

www.mkds.lt

Paralēlās tirdzniecības atļaujas īpašnieks un izplatītājs:

SIA "Agrimatco Latvia"

Tīraines iela 5c, Rīga, LV-1058

Tel.: 67807711

E-pasts: agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com

Pirmā palīdzība.

Ja augu aizsardzības līdzeklis:

- nonācis acīs, tās nekavējoties skalot ūdens strūklā 15 minūtes;
- nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes;
- nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens;
- ieelpots, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlams ārsta konsultācija.

Norādījumi ārstam: simptomātiska ārstēšana. Ārstam uzrādīt preparāta marķējumu.

Saīdēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība.

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku un dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu (darba apģērbu), ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Darba laikā ievērot personiskās higiēnas noteikumus. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi pēc darba rūpīgi jānotīra – jāmazgā. Neatstāt bez uzraudzības sagatavotu darba šķidrumu un neizlietotu augu aizsardzības līdzekli. Aizliegts izliet kanalizācijā darba šķidrumu pārpalikumu. Smidzināšanas darbu veikšanas laikā aizliegts nepiederošām personām uzturēties vietā, kur strādā ar augu aizsardzības līdzekļiem.

Iedarbība.

Tropiskais augs *Azadirachta indica* A.Juss, Indijā izplatīts un tā ekstrakti no dažādām auga daļām tiek izmantoti tautas medicīnā jau tūkstošiem gadu. Tos izmanto arī augu kaitēkļu apkarošanai, dzīvnieku ektoparazītu ierobežošanā.

Darbīgās vielas azadiraktīna-A iedarbība augu kaitēkļu ierobežošanā saistīta ar spēju nomākt ādas kutikulas veidošanās hormona ekdizona veidošanos un olu veidošanos pieaugušiem kukaiņiem un ērcēm, kad tie uzņēmuši darbīgo vielu sūcot ar preparātu apstrādātu augu sulu vai ieēdot augu masu. Augstāka efektivitāte, ja augu kaitēkļu kāpuri saindēto barību uzņem jaunākās attīstības stadijās vai pieauguši lapgrauži uzņem barību papildbarošanās laikā pirms olu dēšanas.

Preparātam nav pieskares iedarbība vai ovicīda īpašības. Pēc apstrādātu augu daļu vai augu sulas uzņemšanas, kaitēkļi paliek mazaktīvi – mazāk barojas vai vēlāk pārtrauc barošanos, ka arī kāpuri nenomaina kutikulu un rezultātā iet bojā. Smidzināšanu veikt rīta vai vakara stundās, rūpīgi noklājot visas auga daļas ar darba šķidrumu. Neveikt smidzināšanu intensīvā saules gaismā. Tā kā preparātam nav tūlītējas toksiskas iedarbības uz kaitīgajiem organismiem, par preparāta efektivitāti liecina tas, ka nav pieaudzis augu lapu bojājumu apjoms, kaitīgā organisma koloniju lielums, lapu alojumu apjoms, medus rasas daudzums. Preparāta galīgo efektivitāti novērtē pēc 7-10 dienām. Novērtējot smidzinājuma efektivitāti, nevis bojā gājušo kaitēkļu skaitu, galvenā vērtība piegriežama kaitēkļu aktivitātei, laputu un tīklērcu ierobežošanai smidzinājums atkārtojams pēc 5-7 dienām, tripšu – pēc 10-14 dienām. Lapgrauži pēc saindētas barības uzņemšanas mazāk intensīvi barojas, izdēj ievērojami mazāk olu un no izdētām liela daļa vai visas ir dzīvot nespējīgas. Vajadzības gadījumā pret lapgraužiem smidzinājumu atkārti pēc 12-14 dienām. Dažiem krāšņumaugiem smidzinājums ar NeemAzal var izsaukt ziedu vai lapu apdegumus, tādēļ ieteicama augu novērošana 5-6 dienas pēc sējuma vai stādījuma apstrādes.

Ja lauka kultūras tika pakļautas lietum mazāk par 8 stundām pēc apsmidzināšanas, smidzinājums atkārtojams.

Lietošana:

Apstrādājami kultūraugi	Kaitīgais organisms	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Darba šķidruma deva: l/100m ²	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7

Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.5	5	Apsmidzināt stādījumus, parādoties 1.-2. vecuma kāpuriem	4	2
Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni (atklātā laukā)	Laputis (<i>Aphididae</i>), alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i> , <i>Tuta absoluta</i>), tiklētce (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	3	2
Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni (segtās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i> , <i>Tuta absoluta</i>), tiklētce (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	3	3
Pipari (segtās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tiklētce (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	3	3
Galviņkāposti*, Briseles kāposti*, Savoņas kāposti *	Kāpostu laputs (<i>Brevicoryne brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), kāpostu pūcīte (<i>Barathra brassicae</i>), balteņi (<i>Pieris spp.</i>)	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	3	2
Garšaugi*, izņemot maurlokus (atklātā laukā)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tiklētce (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	14	2
Garšaugi*, izņemot maurlokus (segtajās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tiklētces (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	14	3
Spināti*, skābenes, portulaki, lapu bietes* (atklātā laukā)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	7	2
Ābeles, cidonijas*	Laputis (<i>Aphididae</i>), sprīžmeši (<i>Geometridae</i>), augļu koku sarkanā tiklērce (<i>Panonychus ulmi</i>)*	0.3	10	Apsmidzināt stādījumus, pirms un pēc ziedēšanas, parādoties pirmajām kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	14	2
Vīnogulāji* (neražojoši stādījumi, dēstu un mātes augu stādījumi)	Laputis (<i>Aphididae</i>), maijvaboles (<i>Melolantha spp.</i>)	0.5	4-6	Apsmidzināt stādījumus, pirms un pēc ziedēšanas, parādoties pirmajām kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i.	-	3

				apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus		
Krāšņumaugi, dekoratīvie augi, izņemot skujkokus (atklātā laukā un segtās platībās)	Alotājmušas (<i>Agromyzidae</i>), šaurspārnu kodes (<i>Gracilaridae</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), tīklēces (<i>Tetranychidae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.3-0.5	0.3% -9; 0.5% - 6	Apsmidzināt stādījumus, pirms un pēc ziedēšanas, parādoties pirmajām kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	-	2
Ozoli*	Maijvaboles (<i>Melolantha spp.</i>)	0.3	10	Apsmidzināt vaboļu papildbarošanās laikā	-	1
Ķirši*, plūmes*	Laputis (<i>Aphididae</i>), mazais salnas sprīžmetis (<i>Operothora brumata</i>), ķiršu zāglapsene (<i>Caliroa cerasi</i>), ķiršu pumpuru tīklkode (<i>Aegyresthia pruniella</i>), zāglapsene (<i>Hoplocampa spp.</i>)	0.3	10	Apsmidzināt stādījumus, pirms un pēc ziedēšanas, parādoties kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	7	2
Avenes*, kazenes*	Laputis (<i>Aphididae</i>), mazais salnas sprīžmetis (<i>Operothora brumata</i>)	0.3	10	Apsmidzināt stādījumus, pirms un pēc ziedēšanas, parādoties kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	7	2
Upenes*, jānogas*, ērkšķogas*	Laputis (<i>Aphididae</i>), mazais salnas sprīžmetis (<i>Operothora brumata</i>), jānogulāju zāglapsene (<i>Nematus ribesii</i>), gaiškāju ērkšķogu zāglapsene (<i>Pristiphora rufipes</i>), upeņu dzinumņu pangodiņš (<i>Resseliella ribis</i>)	0.3	10	Apsmidzināt stādījumus, pirms un pēc ziedēšanas, parādoties kaitēkļu bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus	7	2

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (REK) Nr. 1107/2009 51.pantu.

Atbildība.

Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem uz ražas zudumiem.

Piezīmes. Dienā maksimāli apstrādājamā platības lielums – **200m²**.

Smidzināšanas drīkst veikt, ja vēja ātrums nepārsniedz 4 m/s.

Lai izvairītos no insekticīda smidzinājuma ietekmes uz cilvēku un dzīvnieku veselību, ar smidzināšanas darbiem nesaistītām personām un mājdzīvniekiem neatrasties vietā, kur tiek veikts smidzinājums.

Darba šķidruma sagatavošana.

Preparāta izsmidzināšanai izmantojama tikai labi iztīrīta aparatūra. Nepieciešamo preparāta daudzumu ielej muguras smidzinātāja tvertnē, kurā iepildīta puse no nepieciešamā ūdens daudzuma un samaisa, tad pievieno pārējo ūdeni. Sagatavo tikai apstrādei nepieciešamo darba šķidruma daudzumu, jo gatavais darba šķidrums nav uzglabājams un izmantojams sagatavošanas dienā.

Darba šķidruma patēriņš.

Darba šķidrumu sagatavo šādi: **10 litri ūdens pievieno 50 ml NeemAzal un iegūst 0.5% darba šķidrumu.** Lai ievērotu reģistrēto NeemAzal devu apstrādājamajam kultūraugam uz platības vienību, jāzina, cik ātri nepieciešams pārvietoties, lai ar norādītajiem litriem varētu apsmidzināt ne mazāk kā 100m². To var noskaidrot veicot izmēģinājuma smidzinājumu ar tīru ūdeni. Piemēram, kartupeļu stādījumos ar 5 litriem 0.5% darba šķidruma jāapsmidzina ne mazāk kā 100 m² jeb 5 ml preparāta 1 litrā ūdens uz 20 m².

Daži krāšņumaugi var būt jutīgi pret 0.5% darba šķidrumu, tad jālieto **0.3% darba šķidrumu, kuru sagatavo 10 l ūdens pievienojot 30 ml NeemAzal.** Ābeļu un ozolu apsmidzināšanu veic ar 0.3% darba šķidrumu.

Iepakojuma likvidēšana.

Iepakojums pēc iztukšošanas jāizmazgā trīs reizes ar ūdeni, mazgājamais ūdens izmantojams darba šķidruma pagatavošanai. Izmantotais iepakojums jālikvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Smidzināšanas iekārtas un aizsargtērpa tīrīšana.

Pēc darba beigšanas rūpīgi izskalojiet smidzinātāja tvertni ar ūdeni. Mazgājamais ūdens izsmidzināms uz apstrādāta lauka. Ikteiz pēc darba nomazgājaties, notīriet individuālos aizsardzības līdzekļus.

Vides aizsardzība.

Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu un ozolu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm un kartupeļu, dārzenū, vīnogulāju, krāšņumaugu un dekoratīvo augu sējumos un stādījumos 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un paziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. Preparāts bīstams ziedmušas (*Episyrphus balteatus*) kāpuriem, septiņpunktu mārītei (*Coccinella septempunctata*), nav bīstams skrejvabolei (*Poecilus cupreus*), kāpurlapsenei (*Aphidius rhopalosiphi*) un plēsējērcei (*Typhlodromus pyri*).

Uzglabāšana.

Uzglabāt tumšā, vēsā, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās, izolēti no sildierīcēm un atklātas uguns. Uzglabāšanas temperatūra 0°C līdz +25°C. Glabājot temperatūrā zem +10°C, var izveidoties nogulsnes, kuras izzūd, ja iepakojumu ar preparātu uzsilda līdz +30°C, ieliekot silta ūdens vannā, un pēc uzsildīšanas saskalina, un kuras neietekmē preparāta lietošanas efektivitāti.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavosanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Juridiskā atbildība.

Ieteikumi preparāta lietošanai pamatoti uz veiktajiem izmēģinājumiem. Izgatavotājs nav atbildīgs par neparedzētiem apstākļiem: nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, novēlota apstrāde, nepareiza pielietošanas metode, augsnes tips, šķirņu jutība, savietojamība ar citiem preparātiem u.c., kas varētu ietekmēt preparāta iedarbību. Izgatavotājs neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās preparāta paviršas un nepareizas uzglabāšanas rezultātā. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tad, ja tas tiek uzglabāts oriģinālā, noslēgtā iepakojumā.