

**Score
Fungicīds.**

Darbīgā viela: difenokanazols 250 g/l.

Preparāta forma: emulsijas koncentrāts

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 61

Reģistrācijas klase: 3.

Iepakojums: 240 x 5ml, 240 x 10 ml, 20 x 100 ml

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma

Pārfasēšanas datums: skatīt uz iepakojuma



Briesmas

H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH066	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
EUH401	Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
P102	Sargāt no bērniem.
P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargu.
P301+P310	NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P331	NEIZRAISĪT vemšanu.
P305+P351+P338	SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P391	Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P501	Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP1	Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3	Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Ražotājs:

Syngenta Crop Protection AG, Bāzele, Šveice

Kontakttālrunis Latvijā: 63025626.

Pārfasētājs:

UAB Inovacine firma "MKDS"

Piliakalnio 68,

Nemenčine, LT 15175
Vilniaus raj. Sav.
Tālrs.: +370 52 726727
www.mkds.lt

Paralēlās tirdzniecības atļaujas īpašnieks un izplatītājs:

SIA "Agrimatco Latvia"
Tīraines iela 5^c, Rīga, LV-1058
Tel.: 67807711
E-pasts: agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com

Uzglabāšanas nosacījumi.

Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā.
Uzglabāšanas t⁰ no -5°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš.

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

**Score
Fungicīds.**

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu stādījumos, burkānu, seleriju (sakņu), sīpolu, ķiploku, šalotes, galda biešu, krizantēmu (atklātā laukā un segtās platības) sējumos un stādījumos.

Darbīgā viela: difenokanazols 250 g/l.

Preparāta forma: emulsijas koncentrāts

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 61

Reģistrācijas klase: 3.

Iepakojums: 5ml, 10 ml, 100 ml

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma

Pārfasēšanas datums: skatīt uz iepakojuma



Briesmas

H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH066	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
EUH401	Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
P102	Sargāt no bērniem.
P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargu.
P301+P310	NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P331	NEIZRAISĪT vemšanu.
P305+P351+P338	SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdenivairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievainotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P391	Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P501	Atbrīvojoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP1	Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3	Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Ražotājs:

Syngenta Crop Protection AG, Bāzele, Šveice
Kontakttālrunis Latvijā: 63025626.

Pārfasētājs:

UAB Inovacine firma "MKDS"

Piliakalnio 68,
Nemenčine, LT 15175
Vilniaus raj. Sav.
Tālr.: +370 52 726727
www.mkds.lt

Paralēlās tirdzniecības atļaujas īpašnieks un izplatītājs:

SIA "Agrimatco Latvia"
Tīraines iela 5^c, Rīga, LV-1058
Tel.: 67807711
E-pasts: agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com

Uzglabāšanas nosacījumi.

Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā.
Uzglabāšanas t^o no -5°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš.

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Pirmā palīdzība.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens. Neizraisīt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Speciāls antidots nav zināms, pielietot simptomātisko terapiju.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība.

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku un dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.
Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu (darba apģērbu), ķīmiski izturīgus cimdus, acu aizsargus un slēgtus apavus. Darba laikā ievērot personiskās higiēnas noteikumus. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi pēc darba rūpīgi jānotīra – jāmazgā.
Neatstāt bez uzraudzības sagatavotu darba šķidrumu un neizlietotu augu aizsardzības līdzekli. Aizliegts izliet kanalizācijā darba šķidruma pārpalikumu. Smidzināšanas darbu veikšanas laikā aizliegts nepiederošām personām uzturēties vietā, kur strādā ar augu aizsardzības līdzekļiem.

Preparāta apraksts.

Difenokonazols pieder triazolu ķīmiskai klasei un tam ir līdzīga iedarbība kā citiem triazolīem, kas ir DMI – demetilācijas inhibitori. Sēnes attīstība tiek apturēta, iejaucoties sterolu biosintēzē šūnu membrānās, kā rezultātā hifas aiziet bojā.
Difenokonazols ir translaminārs fungicīds ar ilgstošu aizsargājošo un ārstējošo iedarbību pret *Deuteromycetes*, *Basidiomycetes* un *Ascomycetes* sēnēm.

Devas un lietošanas laiks.

Apstrādājami kultūraugi	Kaitīgie organismi	Preparāta deva ml/10 l ūdens	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā	Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā platība, m ²
Ābeles	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>)	2	Apsmidzināt profilaktiski, kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot no ziedēšanas sākuma līdz augļu veidošanās stadijai (AS 61–84). Atkārtoti apsmidzināt pēc 10 dienām.	21	2	100
Bumbieres	Bumbieru kraupis (<i>Venturia pyrina</i>)	2	Apsmidzināt profilaktiski, kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot no ziedēšanas sākuma līdz augļu veidošanās stadijai (AS 61–84). Atkārtoti apsmidzināt pēc 10 dienām.	21	2	100
	Bumbieru-kadiķu rūsa (<i>Gymnosporangium fuscum</i>) *		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos lapu plaukšanas laikā.			
Ķirši	Kaulenķoku pelēkā puve (<i>Monilinia laxa</i>), parastā augļu puve (<i>Monolinia fructigena</i>)	2	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar atsevišķu ziedpumpuru atdalīšanos līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļu krāsojums (AS 56–85), atkārtoti pēc 10–14 dienām.	14	2	100
Plūmes	Parastā augļu puve (<i>Monolinia fructigena</i>)	2	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļu krāsojums (AS 61–85), atkārtoti pēc 10–14 dienām.	14	2	100
Burkāni*	Burkānu lapu sausplankum ainība (<i>Alternaria dauci</i>)	10	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 14 dienām.	21	3	250
Selerijas (sakņu)*	Seleriju lapu gaišplankuma	10	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm.	21	1	250

	inība (<i>Septoria apiicola</i>)					
Sīpoli*, ķiploki*, šalotes*	Sīpolu lapu plankumainība (<i>Alternaria porri</i>), sīpolu rūsa (<i>Puccinia alli</i>)	10	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm.	21	1	250
Galda bietes*	Lapu plankumainības (<i>Cercospora beticola</i> , <i>Ramularia beticola</i>)	10	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm.	28	1	250
Krizantēmas* (atklātā laukā)	Krizantēmu baltā rūsa (<i>Puccinia horiana</i>)	10	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski.	-	1	250
Krizantēmas* (segtās platībās)	Krizantēmu baltā rūsa (<i>Puccinia horiana</i>)	10 – augi līdz 50 cm, 15 – augi līdz 125 cm augsti	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, atkārtoti pēc 4 nedēļām.	-	2	250

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu.

Atbildība.

Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem vai ražas zudumiem.

Piezīme. Dienā maksimāli apstrādājamās platības lielums – **1000 m²**. Smidzināšanu drīkst veikt, ja vēja ātrums nepārsniedz 4 m/s.

Lietojot Score ārstnieciskā nolūkā, tas jāizsmidzina 96 stundu laikā no kraupja infekcijas sākuma. Score iesaka lietot galvenokārt kraupja primārās infekcijas kritiskajā periodā.

Lai izvairītos no fungicīda smidzinājuma ietekmes uz cilvēku un dzīvnieku veselību, ar smidzināšanas darbiem nesaistītām personām un mājdzīvniekiem neatrasties vietā, kur tiek veikts smidzinājums.

Bezlietus periods: 2 stundas.

Darba šķidruma sagatavošana.

Pirms darba šķidruma sagatavošanas muguras smidzinātājā, nepieciešams veikt smidzināšanas pārbaudes ar tīru ūdeni, lai noskaidrotu darba šķidruma patēriņu uz 100 m², līdz ar to, ja nepieciešams, attiecīgi var korigēt pārvietošanās ātrumu smidzināšanas laikā. Darba šķidrumu sagatavo atbilstoši paredzētajai apsmidzināmajai platībai, lai pēc apstrādes, darba

šķidrums nepaliktu pāri smidzinātāja tvertnē. Ja šī platība ir mazāka par lietojuma tabulā norādīto, tad jāveic papildus aprēķini.

Piemēram, ja apstrādājamā platība augļu kokiem ir 50 m², tad ņem tikai 5 litrus ūdens, kuriem pievieno 1 ml preparāta. Tvertne līdz pusei jāuzpilda ar ūdeni un jāpievieno nepieciešamais Score daudzums. Tad jāiepilda pārējais nepieciešamais ūdens daudzums. Jānodrošina šķidruma maisīšana darba šķidruma sagatavošanas un smidzināšanas laikā. Katru reizi pēc darba beigām miglotājs rūpīgi jāizmazgā ar tīru ūdeni un mazgājamais ūdens jāizsmidzina uz apstrādātās platības.

Kultūraugu izturība.

Lietojot Score saskaņā ar rekomendācijām, nepastāv fitotoksiskuma risks.

Savietojamība.

Score ir lietojams maisījumos ar biežāk lietojamiem insekticīdiem un fungicīdiem. Neskaidrību gadījumos griezties firmu pārstāvniecībās.

Tukšais iepakojums.

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

Šķidruma izšļakstīšanās vai noplūde.

Stipri saindētu augsnes slāni vai izlijušo preparātu var savākt to apberot ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni, tad ar ķimikāliju piesūkušos materiālu savākt, ievietot speciāli marķētā konteinerā un ziņot attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Piezīme: izlijušo preparātu aizliegts izmantot.

Vides aizsardzības prasības.

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Uzglabāšanas nosacījumi.

Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā.

Uzglabāšanas t^o no -5°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš.

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Juridiskā atbildība.

Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta visos gadījumos, kas ir ārpus ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. Ražotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles.