

Metric[®] ZC

Augsnes iedarbības herbicīds.
Lietot pirms kartupeļu un nezāļu sadīgšanas.

- Ērti lietot
- Plašam nezāļu spektram
- Saderīgs bāku maisījumos



Lietošana

- Metric ZC izsmidzina pirms kartupeļu un nezāļu sadīgšanas. Herbicīda efektivitāte samazinās, ja pēc izsmidzināšanas iestājas ilgstošs sausuma periods.
- Nelietot viegla mehāniskā sastāva augsnēs un augsnēs ar augstu organisko vielu saturu virs 5 %.
- Augsnei jābūt sīki drupatainai un vēlams arī mitrai.
- Ieteicamais ūdens patēriņš 200-400 l/ha
- Deva: 1,5 l/ha

Efektivitāte

Parastais aklis	<i>Galeopsis tetrahit</i>	95-100 %
Ārstniecības matuzāle	<i>Fumaria officinalis</i>	95-100 %
Baltā balanda	<i>Chenopodium album</i>	85-95 %
Dārza vējagrīķis	<i>Fallopia convolvulus</i>	85-95 %
Ganu plikstiņš	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	95-100 %
Izplestā balodene	<i>Atriplex patula</i>	95-100 %
Sīkā nātre	<i>Urtica urens</i>	95-100 %
Ķeraiņu madara	<i>Galium aparine</i>	95-100 %
Parastā gaišsāre	<i>Echinochloa crus-galli</i>	95-100 %
Rudzupuķe	<i>Centaurea cyanus</i>	95-100 %
Parastā virza	<i>Stellaria media</i>	95-100 %
Persijas veronika	<i>Veronica persica</i>	95-100 %
Sārtā panātre	<i>Lamium purpureum</i>	95-100 %
Skaujošā panātre	<i>Lamium aplexicaule</i>	95-100 %
Tīruma naudulis	<i>Thlaspi arvensis</i>	95-100 %
Tīruma pērkone	<i>Raphanus raphanistrum</i>	95-100 %
Tīruma vijolīte	<i>Viola arvensis</i>	95-100 %
Tīruma sinepe	<i>Sinapis arvensis</i>	85-95 %
Liektais amarants	<i>Amaranthus retroflexus</i>	85-95 %
Blusu sūrene	<i>Polygonum persicaria</i>	70-90 %
Maura sūrene	<i>Polygonum aviculare</i>	85-95%
Parastais velnābols	<i>Datura stramonium</i>	85-95 %
Melnā naktene	<i>Solanum nigrum</i>	85-95%

Metric[®] ZC

Augsnes iedarbības herbicīds.
Lietot pirms kartupeļu un nezāļu sadīgšanas.



SIA „Agrimatco Latvija”
Tiraines iela 5, Rīga
Tel. 67807711
www.agrimatco.lv

VEIKALI:
Rīgā, Tiraines ielā 5c, tel.: 29 106 592; 67 807 712
Iecavā, Rīgas ielā 49, tel.: 26 458 969; 63 941 087
Valmierā, Rīgas ielā 76a, tel.: 25 414 342; 64 207 712

PĀRSTĀVJI REĢIONOS:
Latgalē: 26 482 292
Zemgalē: 27 656 624
Kurzemē: 27 273 774
Vidzemē: 28 639 542



Nordisk Alkali

member of the Belchim Group


Pārsēšana un pēcaugs

Ja 5 līdz 6 nedēļas pēc Metric ZC smidzināšanas kartupeļu stādījumi iznīkuši, tad atkārtoti stādīt kartupeļus, sēt pupas, kukurūzu, burkānus vai miežus var pēc lauku uzaršanas (vismaz 15 cm dziļumā). Tā paša gada rudenī vai nākamā gada pavasarī var sēt un stādīt visus kultūraugus pēc augsnes uzaršanas (vismaz 15 cm dziļumā).

Divu darbīgo vielu apvienojums, kur

KLOMAZONS 60 g/l

- ledarbojas uz nezālēm caur saknēm.
- Bloķē karotinoīdu pigmentu biosintēzi, kas atbild par gaismas enerģijas uztveršanu fotosintēzei un aizsargā augu no skābekļa agresīvajām formām.
- Rezultātā nezāles sadīgst, bet, sasniedzot augsnes virspusi, kļūst baltas un iet bojā. Dažkārt hloroze un nezāļu bojāeja parādās tikai attīstoties to īstajām lapām.



METRIBUZĪNS 233 g/l

- ledarbojas uz nezālēm caur saknēm un arī caur dīgstiem.
- Nezālēs pārvietojas caur ksilēmu akropetāli (virzienā uz augšu) un darbojas kā fotosintēzes elektronu transporta inhibitors

Preparatīvā forma (ZC)



KLOMAZONS kapsulu suspensija (CS)



METRIBUZĪNS suspensijas koncentrāts (SC)

= kapsulu suspensijas un suspensijas koncentrāta maisījums (ZC)

Aktīvo vielu sinhrona iedarbība



Nepastāvības samazināšana

- Labāka noturība
- Augstāka efektivitāte
- Izteiktāka selektivitāte

Kontrolētās nezāles



Amaranthus spp.



Chenopodium album



Polygonum spp.



Mercurialis annua



Ambrosia spp.



Kontrolē



Metric 1.5 l/ha

Ieteikums

Metric ZC ir jālieto tūdaļ pēc augsnes apstrādes, kamēr augsne ir dabiski mitra, un herbicīds iedarbotos maksimāli efektīvi, un noteikti pirms kartupeļu un nezāļu sadīgšanas.

Lietošanas shēma

Deva 1,5 l/ha

Apstrāde ar Metric ZC

