

Aizsargiepakojuma marķējums

CHAMPION® 50 WG Fungicīds, baktericīds.

APSTIPRINU
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja
R. Čudera
2016. g. 16. marta

Aizsargājošs pieskares iedarbības fungicīds sēņu un bakteriālo slimību ierobežošanai kartupeļu, ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, vīnogu, upeņu, jāņogu, ērkšķogu, aveņu, kazeņu, krūmmelleņu un krāšņumaugu stādījumos.

Darbīgā viela: varš, 500 g/kg (vara hidroksīda formā)

Preparatīvā forma: disperģējamas granulas.

Reģistrācijas klase: 2

Reģistrācijas Nr. 0139

Iepakojums: 10x 1 kg

Partijas Nr. Skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: Skatīt uz iepakojuma



Briesmas

H302 Kaitīgs, ja norij.

H315 Kairina ādu.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H331 Toksisks ieelpojot.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P261 Izvairīties ieelpot putekļus

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

P311 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot 35 m aizsargjoslu ķiršu un plūmju stādījumos, 30 m aizsargjoslu ābeļu un bumbieru stādījumos, 15 m aizsargjoslu vīnogu

SAŅEMTS Nr. 200
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļā
2016. g. 16. marta

un ogulāju stādījumos un 10 m aizsargjoslu kartupeļu stādījumos līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam- telefons 112

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālā ar etiķeti marķētā iepakojumā, sausās labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas temperatūra 0 līdz +40 ° C. Nedrīkst uzglabāt apsildāmo ierīču vai atklātas uguns tuvumā.

Derīguma termiņš. 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: Nufarm GmbH&Co KG, St Peter Str. 25, A-4021 Linca, Austrija

Importētājs: SIA Baltic agro
Vandzenes iela 3
Rīga, LV – 1046
Tāl.: 6 7 228851

SIA Agrimatco Latvia
Tīraines iela 5c
Rīga, LV - 1058
Tāl: 67807711

CHAMPION® 50 WG

Fungicīds, baktericīds.

Aizsargājošs pieskares iedarbības fungicīds sēņu un bakteriālo slimību ierobežošanai kartupeļu, ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, vīnogu, upeņu, jāņogu, ērkšķogu, aveņu, kazeņu, krūmmelleņu un krāšņumaugu stādījumos.

Darbīgā viela: varš, 500 g/kg (vara hidroksīda formā)

Preparatīvā forma: disperģējošas granulas.

Reģistrācijas klase: 2

Reģistrācijas Nr. 0139

Iepakojums: 10kg, 1 kg

Partijas Nr. Skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: Skatīt uz iepakojuma



Briesmas

H302 Kaitīgs, ja norij.

H315 Kairina ādu.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H331 Toksisks ieelpojot.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P261 Izvairīties ieelpot putekļus

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

P311 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvojoties no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas

caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot 35 m aizsargjoslu ķiršu un plūmju stādījumos, 30 m aizsargjoslu ābeļu un bumbieru stādījumos, 15 m aizsargjoslu vīnogu un ogulāju stādījumos un 10 m aizsargjoslu kartupeļu stādījumos līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam- telefons 112

Uzglabāšana

Uzglabāt oriģinālā ar etiķeti marķētā iepakojumā, sausās labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas temperatūra 0 līdz +40 ° C. Nedrīkst uzglabāt apsildāmo ierīču vai atklātas uguns tuvumā.

Derīguma termiņš. 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: Nufarm GmbH&Co KG, St Peter Str. 25, A-4021 Linca, Austrija

Importētājs: SIA Baltic agro
Vandzenes iela 3
Rīga, LV – 1046
Tāl.: 6 7 228851

SIA Agrimatco Latvia
Tīraines iela 5c
Rīga, LV - 1058
Tāl: 67807711

Pirmā medicīniskā palīdzība:

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 min.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 min.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Informācija ārstam: Lietot simptomātisko ārstēšanu. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 6 7042473.

Drošības prasības un personāla drošība.

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Augu aizsardzības līdzekli uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi vides aizsardzības, darba drošības un personiskās higiēnas noteikumi. Strādājot ar preparātu lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, respiratoru, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

Iedarbība.

Darbojas kā aizsargājošs pieskares fungicīds. Varš, nokļūstot patogēno sēņu šūnās, rada to protoplazmas koagulāciju, un tās aiziet bojā.

Lietošana:

Apstrādājамie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Ābeles, bumbieres	Augļu koku vēzis (<i>Nectria galligena</i>)	1.0		Apsmidzināt pavasarī miera periodā pēc zaru apgriešanas līdz zaļa konusa stadijai (AS 53) vai rudenī pēc lapu nobiršanas.	-	4
Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5-2.0		Apsmidzināt kartupeļu stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti pēc 7-10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes.	7	2
Vīnogas*	Vīnkoku īstā miltrasa (<i>Uncinula necator</i>), neīstā miltrasa (<i>Plasmopara viticola</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumu pavasarī, sākot no pumpuru plaukšanas līdz ziedēšanai. Atkārtoti pēc 10-14 dienām.	-	2
Ķirši*, plūmes*	Kaulenķoku sausplankumainība (<i>Stigmina carpophila</i>), kaulenķoku pelēkā puve (<i>Monilia laxa</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus agri pavasarī pirms ziedēšanas	-	1
Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*	Ogulāju lapu iedegas (<i>Drepanopeziza ribis</i>), lapu sīkplankumainība	2.0		Apsmidzināt stādījumus pavasarī pirms lapu plaukšanas vai rudenī pēc ražas novākšanas.	-	2

	<i>(Mycosphaerella ribis)</i>					
Avenes*, kazenes*	Avenāju mizas plaisāšana <i>(Didymella applanata)</i> , avenāju iedegas <i>(Elsinoe veneta)</i>	2.0		Apsmidzināt stādījumus pavasarī pirms lapu plaukšanas vai rudenī pēc ražas novākšanas.	-	2
Krūmmellenes *	Bakteriālais vēzis <i>(Pseudomonas spp.)</i>	2.0		Apsmidzināt stādījumus vēlu rudenī	-	2
Krāšņumaugi segtās platībās: filodendroni*, arālijas*	Lapu plankumainības <i>(Xanthomonas spp., Cercospora spp., Alternaria spp.)</i>		0.10- 0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10-14 dienām.	-	2
acālijas*	Lapu plankumainības <i>(Cercospora spp.)</i> , pelēkā puve <i>(Botrytis cinerea)</i> , sakņu puve <i>(Phytophthora spp.)</i>		0.10- 0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10-14 dienām.	-	2
jukas*	Lapu plankumainības <i>(Cercospora spp., Septoria spp.)</i>		0.10- 0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10-14 dienām.	-	2
Rozes* (segtās platībās un atklātā laukā)	Miltrasa <i>(Sphaerotheca spp.)</i> , rožu lapu tumšplankumainība <i>(Marssonina rosae)</i>		0.10- 0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10-14 dienām.	-	2
Neļķes* (segtās platībās un atklātā laukā)	Lapu plankumainības <i>(Alternaria spp., Pseudomonas sp.)</i> , pelēkā puve <i>(Botrytis cinerea)</i>		0.10- 0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10-14 dienām.	-	2
Begonijas* (segtās platībās un atklātā laukā)	Bakterize <i>(Xanthomonas sp.)</i> iedegas <i>(Glomerella</i>		0.10- 0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm.	-	2

	<i>cingulata</i>)			Atkārtoti pēc 10-14 dienām.		
Krizantēmas* (segtās platībās un atklātā laukā)	Lapu plankumainības (<i>Septoria sp.</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)		0.10-0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10-14 dienām.	-	2
Lilijas*, tulpes*, gladiolas*	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)		0.10-0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10-14 dienām.	-	2
Klinteres*	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)		0.10-0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10-14 dienām.	-	2
Pirakantas*, segliņi*, efejas*	Bakterioze (<i>Xanthomonas sp.</i>), iedegas (<i>Glomerella cingulata</i> , <i>Colletotrichum spp.</i>), kraupis (<i>Sphaceloma spp.</i>)		0.10-0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10-14 dienām.	-	2

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (REK) Nr. 1107/2009 51.pantu.

Atbildība.

Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Rezistences riska ierobežošana.

Champion 50 WG ir fungicīds, kurš satur darbīgo vielu varu. Varš saskaņā ar FRAC klasifikāciju, kas balstīta uz darbīgo vielu iedarbības veidu (MoA), pieder grupai M1- daudzpusīgas iedarbības vielas. Līdz šim nav novērota sēņu rezistence pret šīs grupas darbīgajām vielām.

Tā kā fungicīds Champion 50 WG satur darbīgo vielu, kurai līdz šim nav novērota rezistence pret sēņu slimību ierosinātājiem, tad lietojot šo fungicīdu saskaņā ar lietošanas norādījumiem, nav nepieciešams izstrādāt speciālu pretrezistences stratēģiju šī fungicīda lietošanai.

Darba šķidruma sagatavošana:

Vajadzīgo fungicīda daudzumu speciālā traukā iemaisa nelielā ūdens daudzumā un pagatavo koncentrētu preparāta suspensiju. Smidzinātāja tvertnē iepilda pusi no nepieciešamā ūdens daudzuma, ieslēdz maisītāju un caur filtru ielej sagatavoto suspensiju. Ieslēdz maisītāju, pēc tam pielej atlikušo ūdens daudzumu. Darba šķidrums nepārtraukti jāmaisā transportēšanas un smidzināšanas laikā.

Iepakojuma likvidēšana.

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšo taru uzglabā glabāšanas vietā un likvidē noteiktā kārtībā, ievērojot spēkā esošo likumdošanu.

Vides aizsardzības prasības.

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot 35 m aizsargjoslu ķiršu un plūmju stādījumos, 30 m aizsargjoslu ābeļu un bumbieru stādījumos, 15 m aizsargjoslu vīnogu un ogulāju stādījumos un 10 m aizsargjoslu kartupeļu stādījumos līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot «Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā» rekomendācijas. Preparāta izbiršanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana.

Uzglabāt oriģinālā ar etiķeti marķētā iepakojumā, sausās labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas temperatūra 0 līdz +40 °C. Nedrīkst uzglabāt apsildāmo ierīču vai atklātas uguns tuvumā.

Derīguma termiņš.

2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Juridiskā atbildība.

Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir nepareiza uzglabāšana vai lietošana.

® reģistrēta NUFARM GmbH&Co KG, Austrija tirdzniecības zīme.