

EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS
Borskābes un bora etanolamīna šķīdums
OMEX FOLIAR BORON

Deklarētie rādītāji:

Ūdenī šķīstošais bors (B) 11 %

Citi rādītāji:

pH 8-9
Satur arī slāpekli (N) amīnu formā 4,8 %
Īpatnējais svars 1,36 g/ml@18 °C

Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. Nepārsniegt attiecīgās devas.

OMEX FOLIAR BORON LIETOŠANA:

Novērš bora deficītu kāpostaugos, sakņaugos, ābolos, tomātos, bietēs un rapsī.

Dārzeni: 3,0 L/ha tiklīdz ir pietiekami attīstījusies lapu virsma.

Augļi : 2.0 L/ha 3 reizes ar 2-3 nedēļu intervālu pēc ziedlapu nokrišanas.

Bietes : 2,0 -5,0 L/ha pirms biešu lapu sakļaušanās.

Rapsis: 2,0 L/ha vienu reizi rudenī un vienu reizi pavasarī.

ŪDENS DAUDZUMS:

Nepieciešamais ūdens daudzums OMEX FOLIAR BORON šķīduma pagatavošanai ir 200 – 400 l/ha.

1,36 kg/1 L
4,08 kg/3 L
6,80 kg/5 L
13,6 kg/10 L
27,2 kg/20 L,
272 kg/200 L,
1360 kg/1000 L

Ražotājs:
OMEX AGRIFLUIDS LTD

ESTUARY ROAD
KING'S LYNN
NORFOLK, PE 30 2HH
ENGLAND
Tel. (44)- 1553 – 692380
FAX: (44) – 1553 – 770684
www.omex.co.uk

Ievedējs :



AGRIMATCO LATVIA SIA

TĪRAINES IELA 5C
RĪGA, LV 1058
LATVIA
Tel: (+ 371) 67807711
Fakss: (+371) 67672217
www.agrimatco.lv

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SAJAUKŠANA UN MIGLOŠANA:

Vienmēr ielejiet šo produktu miglošanas tvertnē pirmo, pirms uzsākat sajaukšanu ar ūdeni. Lai mēslojums augu nosegtu labāk, tad iesakām pievienot virsmas aktīvo vielu. Pirms lietošanas saskalojiet!

SAJAUKŠANA TVERTNĒ UN SAVIENOJAMĪBA:

OMEX FOLIAR BORON ir biezs šķīdums, kas ir savienojams ar lielāko daļu augu aizsardzības līdzekļiem. Kompānija Omex neatbild par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas sajaukšanas gadījumā. Sagatavotā šķīduma (augu aizsardzības līdzekļa un OMEX FOLIAR BORON) efektivitāte ir atkarīga no tādiem faktoriem, kā auga stāvoklis, auga attīstības stadija, laika apstākļi un lietotā ūdens daudzums un pesticīda sastāvs. Pirms sajauciet OMEX FOLIAR BORON ar pesticīdiem nepieciešamajā daudzumā, vienmēr sagatavojiet šo šķīdumu nelielā tilpumā!

UZGLABĀŠANA :

OMEX FOLIAR BORON uzglabā sausās, vēsās, labi vēdināmās telpās, kur tas nevar sasalt. Optimālā temperatūra uzglabāšanai ir 5 – 40 °C. OMEX FOLIAR BORON nav uzliesmojošs. Lietojiet cimodus un sejas aizsegu, kad strādājat ar koncentrātu. OMEX FOLIAR BORON koncentrētā veidā ir maz toksisks, bet var radīt acu un ādas kairinājumu. Ja radies kāds no šiem simptomiem, tad konsultējaties ar ārstu. Lai iegūtu papildus tehnisko informāciju, lūdzu kontaktēties ar Omex Agrifluids Ltd vai produkta izplatītāja.



Xi Kairinošs

R36/37/38 Kairina acis, elpošanas sistēmu un ādu.
S 23 Neieelpot gāze/dūmi/tvaiki/aerosols
S 51 Lietot labi vēdināmās telpās.

Partijas Nr.: