



Sastāvs

Barības elements		Basfoliar 20-19-19	Basfoliar 15-30-15	Basfoliar 7-12-40
N	Slāpeklis	20%, t.sk. amonija (N-NH ₄) 3.8%, nitrātu (N-NO ₃) 5%, amīdu (N-NH ₂) 11.2%	15%, t.sk. amonija (N-NH ₄) 6%, amīdu (N-NH ₂) 9%	7%, t.sk. amonija (N-NH ₄) 0.01%, nitrātu (N-NO ₃) 6.99%
P ₂ O ₅	Fosfors, neitrālā amonija citrātā un ūdenī šķīstošais	19%	30%	12%
K ₂ O	Kālijs, ūdenī šķīstošais	19%	15%	40%
B	Bors	0.013%	0.036%	0.011%
Cu	Varš, helātu veidā	0.04%	0.03%	0.019%
Fe	Dzelzs, helātu veidā	0.1%	0.08%	0.05%
Mn	Mangāns	0.1%	0.08%	0.05%
Mo	Molibdēns	0.003 %	0.002%	0.001%
Zn	Cinks	0.03%	0.03%	0.019%
Mg	Magnijs, ūdenī šķīstošais			1.2%

Raksturojums

- Basfoliar mēslojumi satur NPK un mikroelementus. Helātu formā mikroelementi augiem ir vieglāk uzņemami.
- Basfoliar mēslojums ir ātri šķīstošs. 99% izšķīst 10 minūtēs.
- Basfoliar piemērots lietošanai visiem sprauslu tiptiem un to var lietot kopā ar fungicīdiem vai insekticīdiem.
- Basfoliar lietošana palīdz augiem pārvarēt tādas stresa apstākļus kā sausums, karstums, slimības, kaitēkļi.
- Basfoliar smidzināšana caur lapām kļūst par nepieciešamību, ja augs nevar uzņemt mēslojumu ar saknēm, ja ir augsts pH līmenis augsnē, kā arī zems barības vielu daudzums augsnē.
- Basfoliar nav hidroskopsks.



Lietošanas veidi:

- caur lapām
- šķīdinot ūdenī
- pilienlaistīšanas sistēmās

Lietošana

Biežāka mēslošana ar zemākas koncentrācijas šķīdumu nodrošina vislabākos rezultātus! Basfoliar ir lielisks papildinājums tradicionālajai augu pamatmēslošanai.

Basfoliar mēslojuma lietošana dārzenos:

Kultūras	Koncentrācija, 1000 L/ha šķīduma	Vienas reizes lietošanas deva kg/ha
Siltumnīcās un tuneļos, ja lieto maisījumā ar augu aizsardzības līdzekļiem	0.05- 0.1	0.5 - 1
Jūtīgas kultūras, t.sk. dēsti, salāti, u.c.	0.1 – 0.2	1 – 2
Lauka kultūras, t.sk. graudaugi	0.2 – 0.5	2 – 5
Bietes	0.2-0.4	2 - 4
Kartupeļi	0.1-0.3	1-3
Dārzeni, ražojoši	0.2-0.4	2 - 4
Augļi	0.3-0.5	3-5

Basfoliar mēslojuma lietošana dekoratīvās kultūrās:

Kultūra	Koncentrācija	Basfoliar g/100l ūdens	Mēslošanas reizes nedēļā
Dārzeni dēstu stadijā	0.1- 0.3	100 – 300	1-2
Dārzeni, pēc izstādīšanas	0.2- 0.4	200 -400	1-2
Grieztie ziedi	0.2-0.3	200 – 300	1-2
Podu kultūras, jaunstādi	0.05-0.3	50 – 300	1-2
Podu kultūras, pieauguši augi	0.1- 0.4	100-400	1-4

400l ūdens/100 m² = 4mm

Basfoliar mēslojuma lietošana mēslojot augus caur laistāmajām sistēmām:

Kultūraugu jūtība	Maksimālais Basfoliar daudzums g/l ūdenī *	Kultūras
Jūtīgi	1.3	Zemenes, paprika, salāti, burkāni, pupas
Vidēji jutīgi	2.5	Tomāti, spināti, gurķi, ķirbjeidīgie
Maz jutīgi	5.0	Bietes, asperāgi

*Ja sāļu koncentrācija (EC) laistāmajā ūdenī ir tuvu 0.

! Neiesakām pārsniegt tabulā minētās devas.